

questa scheda è raggiungibile all'indirizzo:

[http://www.marginatasarda.it/lepaginedimara/ornitologia\\_sarda.htm](http://www.marginatasarda.it/lepaginedimara/ornitologia_sarda.htm)

## EGRETTA ALBA

*Linnaeus, 1758*

versione scheda 01 del 14 novembre 2013

<i>it</i>	Airone bianco maggiore
<i>sar</i>	Menga, Crobu piscadori, Corvu ambidaggiu
<i>ing</i>	Great Egret
<i>fr</i>	Grande aigrette
<i>cast</i>	Garza blanca
<i>cat</i>	Agrò blanc
<i>ted</i>	Silberreiher
<i>jap</i>	ダイサギ

### diffusione

Cartina della diffusione non disponibile.

azzurro = nidifica

rosso = stanziale

verde = sverna

### classificazione

<i>Ordine</i>	Pelecaniformes
<i>Famiglia</i>	Ardeidae
<i>Genere</i>	Ardea
<i>Specie</i>	Ardea Alba

### riconoscimento

L'Airone bianco maggiore ha il piumaggio di color bianco candido, le scapolari sono allungate e costituiscono le lunghe egrette. I sessi si assomigliano. Nella fase riproduttiva il becco è giallo ma, con l'intensa vascolarizzazione controllata dagli ormoni sessuali, si colora di nero. La

colorazione delle zampe e dei piedi varia dal bruno al nerastro. Le dita sono quattro e lunghe. L'unghia posteriore del dito medio è dentellata sul margine interno ed è utilizzata per assestare il piumaggio. Si distingue dalla Garza perché rimane più grande e per la diversa colorazione delle zampe, dei piedi e del becco. Mentre durante il volo si può distinguerli dalle Cicogne perché il movimento del battito delle ali è più lento e il collo è tenuto a forma di "S". Normalmente l'Airone bianco maggiore è silenzioso quand'è lontano dalla colonia, ma quando raggiunge il nido emette dei versi profondi e gracchianti. Misura in lunghezza 85-105 cm; l'apertura alare e pari a 140-170 cm e pesa 950-1700 g.

### riproduzione

Nidifica in colonie, e si può associare con le altre specie di aironi. Il nido è costruito tra le fitte canne che si trovano nelle zone palustri. L'uovo ha le dimensioni medie mm 61 x 43. Una covata completa comprende 2-5 uova. La cova dura 25 giorni e viene effettuata da entrambi i genitori. I pulcini sono accuditi e nutriti da entrambi i genitori. I pulcini sono già atti al volo all'età di 40 giorni. La maturità sessuale viene raggiunta al terzo anno di età.

### alimentazione

La sua dieta è composta principalmente di pesci, anfibi, e piccoli rettili, e normalmente caccia in piccoli gruppi. Quando l'acqua è bassa, si ciba camminando col corpo orizzontale e fermandosi per afferrare le prede con

**questa scheda è raggiungibile all'indirizzo:**

**[http://www.marginatasarda.it/lepagedimara/ornitologia\\_sarda.htm](http://www.marginatasarda.it/lepagedimara/ornitologia_sarda.htm)**

precisi colpi di becco, quando è profonda resta immobile al limite della buca, con la testa e il collo leggermente inclinato, osservando il fondo: avvistata la preda, di scatto immerge il collo per catturarla.