

questa scheda è raggiungibile all'indirizzo:

http://www.marginatasarda.it/lepaginedimara/ornitologia_sarda.htm

PHOENICOPTERUS RUBER ROSEUS

Pallas, 1811

versione scheda 01 del 20 ottobre 2013

<i>it</i>	Fenicottero Rosa
<i>sar</i>	Dzent'arrùbia, Mangòni, Mangòni, Gent'arrùbia
<i>ing</i>	Greater Flamingo
<i>fr</i>	Flamant rose
<i>cast</i>	Flamenco comùn
<i>cat</i>	Àlic roig
<i>ted</i>	Flamingo
<i>jap</i>	オオフラミンゴ

classificazione

<i>Ordine</i>	Phoenicopteriformes
<i>Famiglia</i>	Phoenicopteridae
<i>Genere</i>	Phoenicopterus
<i>Specie</i>	Phoenicopterus Ruber Roseus

riconoscimento

I sessi si assomigliano, anche se però il maschio rimane leggermente più grande. Gli adulti hanno il collo e le zampe lunghi e tendenti dal bianco al rosa, mentre la testa e la coda tendenti dal bianco al rosa. Il becco è ricurvo verso il basso e di color rosa con apice nero. L'intensità della colorazione del piumaggio varia a seconda della alimentazione. Le copritrici alari sono di color rosa vivo, mentre le remiganti primarie, quelle secondarie e quelle terziarie sono nere. Il contrasto che c'è tra la colorazione delle copritrici alari e le remiganti si nota soprattutto in volo. Fino ai 3-4 anni i giovani si riconoscono perché hanno il piumaggio rosa e sfumato di grigio-bruno, mentre il becco e le zampe sono più scuri. In Sardegna è presente la sottospecie *Phoenicopterus Ruber Roseus* che si distingue dal *Phoenicopterus Ruber* perché ha il piumaggio più chiaro, quasi tendente al rosa. Una femmina misura di lunghezza 130 cm, l'apertura alare è pari a 140 cm e pesa 2000-3500 g. Un maschio misura di lunghezza 130 cm, l'apertura alare e pari a 140 cm e pesa 4000-5600 g.

diffusione



azzurro = nidifica
rosso = stanziale
verde = sverna

questa scheda è raggiungibile all'indirizzo:

http://www.marginatasarda.it/lepaginedimara/ornitologia_sarda.htm

riproduzione

Nidifica in colonie che si trovano nell'acqua bassa e sugli isolotti fangosi dei laghi salmastri. Costruisce un nido fangoso a forma di cono, alto 30-40 cm, la distanza che c'è tra un nido e l'altro è di 20-50 cm. La deposizione viene effettuata a maggio. Un uovo ha le dimensioni medie mm 77-103 x 47-60. Una covata completa comprende 1-2 uova. La cova dura 28-31 giorni e viene effettuata dalla sola femmina che viene alimentata regolarmente dal compagno. I pulcini abbandonano il nido all'età di 11 giorni per poi riunirsi con altri piccoli e vengono accuditi da entrambi i genitori per altri 3 mesi. In questo periodo i pulcini vengono nutriti tramite "latte di piccione" che è un liquido che viene prodotto nel tratto digestivo superiore dei genitori. Raggiunge la maturità sessuale fra il 2° e il 3° anno.

alimentazione

Si nutre principalmente di invertebrati, insetti, crostacei, molluschi e più raramente di alghe, semi, e protozoi. La ricerca del cibo avviene sia di giorno che di notte.