questa scheda è raggiungibile all'indirizzo:
http://www.marginatasarda.it/lepaginedimara/ornitologia_sarda.htm

TURDUS MERULA

Linnaeus, 1758

Specie Turdus Merula

versione scheda 01 del 23 ottobre 2013

it	Merlo
sar	Miùrra, Meùrra, Mèurra, Meùrra
ing	Common Blackbird
fr	Merle noir
cast	Merlo comùn
cat	Merla
ted	Asel
jap	クロウタドリ

diffusione

azzurro = nidifica
rosso = stanziale
verde = sverna

classificazione

Ordine	Passeriformes
Famiglia	Turdidae
Genere	Turdus

riconoscimento

La prima remigante primaria è più corta rispetto alle copritrici primarie, mentre 4ª e 5ª remigante primaria sono le più lunghe, in vece il bordo della 3ª e 6ª remigante primarie sono smarginate sulle penne esterne. Le timoniere esterne sono più corte di 6-10mm. Il maschio di inverno è nero. I vessilli interni delle remiganti sono grigiastri; mentre d'estate le ali sono più brune. Muta completa avviene da agosto a ottobre. All'inizio dell'inverno il becco è nero e macchiato di giallo, mentre alla fine dell'inverno è di color giallo-arancio. La femmina di inverno ha le parti superiori bruno-nero e verde oliva, mentre il dorso, il groppone e la coda più neri. Le ali sono nere. Le parti inferiori sono di color bruno-rossicce, il mento è grigio pallido, i lati del corpo e il sottocoda sono brunastri e leggermente macchiati, i lati del petto e il ventre sono più scuri. All'inizio dell'inverno il becco è bruno-scuro nero e macchiato di giallo, mentre alla fine dell'inverno è di color giallo opaco. D'estate la femmina è più bruna e le parti inferiori sono meno rossicce e meno macchiate. Le zampe e i piedi sono di color bruno scuro, l'iride è bruno scura e ha le palpebre gialle. Il giovane è simile alla femmina, ha le parti superiori sono più marroni, le penne del mantello e le scapolari sono striate fino alla rachide di rossiccio. Il mento e il centro della gola sono fulvi rossicci con apici delle penne bruni; le parti inferiori sono rossicce con apice delle penne bruno scuri, il ventre è più

chiaro, i sottocodali sono brunastri, i sottoalari e le ascellari sono di colore fulvo rossicci. La muta parziale avviene da agosto ad ottobre. Misura ni lunghezza 24-27cm e l'apertura alare e pari a 36-41cm.

riproduzione

La specie è monogama. Nel periodo del corteggiamento i maschi compiono vari atteggiamenti. Il giovane maschio durante il corteggiamento emette dei canti con le penne del vertice solevate, gonfia il piumaggio, tiene le ali distese, la coda è piegata e il becco è spalancato, è compie delle brevi corse e brevi voli verso la futura compagna; mentre il maschio adulto si esibisce solo con una parata nuziale. La scelta del luogo di nidificazione spetta alla femmina come li spetta a provvedere alla procurazione e al trasporto del materiale per il nido. Il nido è a forma di coppa, composta da rami sottili, fibre, erbe secche, ed viene costruito dalla sola femmina. E' situato sui cespugli sempreverdi, siepi, alberi, rampicanti, rocce e tronchi, cataste di legna. La deposizione viene effettuata dalla fine di febbraio a luglio. Le uova sono di colore azzurro-grigio. Un uovo ha le dimensioni medie mm 29,1 x 21,6. Una covata completa comprende 3-6 uova. La cova dura 14-15 giorni e viene effettuata dalla sola femmina che viene alimentata regolarmente dal compagno. Il pulcino alla nascita è ricoperto da un rado piumino lungo e di color grigio fulvo pallido; l'interno del becco è giallo e i margini esterni sono bianchi-giallastri. Vengo effettuate tre covate all'anno.

alimentazione

La dieta alimentare del Merlo varia a seconda della stagione. In autunno ed inverno è prevalente frugivoro, e quindi si alimenta di bacche di numerose piante (sambuco, biancospino, rosa canina, ligustro, viburno, tasso ecc), ciliegie, albicocche, fichi, kaki, uva, mele, pere, fragole, mirtilli, ribes. Durante la primavera e l'estate si nutre di coleotteri, imenotteri lepidotteri, larve sotterranee, vermi, e da numerosi piccoli invertebrati tra i quali artropodi, ragni, miriapodi, molluschi.